

Avertissements agricoles

77M - 28 décembre 1992

GRANDES CULTURES N° 12 - LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

DESHERBAGE DES CULTURES INSTALLEES

BROYEZ D'ABORD LA VEGETATION

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME EN PENSANT AUX NORMES DE PURETE SPECIFIQUE

Les conséquences des mauvaises herbes peuvent être très graves :

- * **Pertes** directes de rendements : jusqu'à 2-3 qx/ha (concurrence pour l'eau et les sols minéraux)
- * **Refus** des lots par impossibilité de triage. Mauvaises herbes interdites en culture : Cuscute, Orobanche, Rumex, Mélilot, Trèfle violet, Renouée persicaire
- * **Réfections** fortes avec des pourcentages excessifs de graines indésirables : Amaranthe, Arroche, Chénopode, Colza, Gaillet, Lampsane, Mauve, Moutarde, Sanve, Plantain, Reseda, Renouée des oiseaux.

Désherber, c'est choisir un programme de traitement en fonction :

- * **Des travaux culturaux et des dates de semis**, c'est à dire du diamètre des racines (sélectivité des produits)
 - supérieur, à 8-10 mm (diamètre d'un crayon) = culture bien développée, bien installée
 - inférieur à 8-10 mm = culture peu développée
- * **Des adventices**
 - plus ou moins diversifiées alors tenir compte du spectre d'action des herbicides
 - peu ou très abondantes et développées alors tenir compte de la dose à utiliser
 - faciles ou très difficiles à détruire alors tenir compte de la dose à utiliser et d'un éventuel programme spécifique



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO B.P.3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél : 67.10.19.50

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

REPOS VEGETATIF		VEGETATION ACTIVE		SPECIALITES COMMERCIALES (et/ou matières actives)	GRAMINEES		DICOTYLEDONES						DOSES/HA de p.c. en kg ou l.	COUT/HA (prix indicatifs H.T.)	
DEC	JANV	FEV	POUSSES de 5cm		APRES précoup.	annuelles	chlendent	mourron ols.	matricaire	véronique	helminthle	lalteron			plss.plant.
I - CULTURES BIEN INSTALLEES /DIAMETRE DES RACINES SUPERIEUR à 8-10 mm															
◆	---	---	◆			●	○	●	●	○	○	○	○	1600 g m.a. +2	230
◆			◆			●	○	●	●	●	●	●	○	1600 g puis 1	675
			◆			○	○	●	●	●	●	●	○	1 (à 1.5)	560
◆	---	---	◆			●	○	○	○	○	○	○	○	3.5	460
---	---	---	---	◆		●	●	○	○	○	○	○	○	1.25 (à 3*)	180
---	---	---	---	◆		●	●	○	○	○	○	○	○	1.5 (à 3*)	300
---	---	---	---	◆		●	●	○	○	○	○	○	○	0.75 (à 1.5*)	400
---	---	---	---	◆		●	●	○	○	○	○	○	○	0.4 (à 0.6)	230
II - CULTURES PEU DEVELOPPEES (semis sous couvert printemps 92 ou automne 92) DIAMETRE DES RACINESINFERIEUR à 8 mm															
◆	---	---	---			●	○	●	○	●	○	○	○	0.5 + 2	410
◆	---	---	---			●	○	●	○	●	○	○	○	1.5	520
◆	---	---	---			●	○	○	○	○	○	○	○	3.5	460
III - TRAITEMENTS SPECIFIQUES (à soigner tout particulièrement)															
			RUMEX (en l'absence de destruction manuelle)		LEGURAME PM (stade rosette-Janv.Fév.) ASULOX (début montaison-stade cigare)	●							6 4	640 780	
			CUSCUTE (sur taches au démarrage)		DACTHAL W 75 + REGLONE 2 PROWL + REGLONE 2 (après précoupe précoce)	○							6 + 2 4 + 2	131 *** 76 ***	

● Efficacité satisfaisante

○ Efficacité moyenne

○ Efficacité insuffisante

* dose efficace contre chiendent rampant

** pour cultures très sales

*** pour 1000 m2

**** risque de phytotoxicité